

## Levitra

10 mg munsönderfallande tabletter  
Vardenafil

### Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
- Om några **biverkningar** blir värre eller om du märker några **biverkningar** som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. VAD LEVITRA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR LEVITRA
3. HUR DU TAR LEVITRA MUNSÖNDER-FALLANDE TABLETTER
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR LEVITRA SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

## 1. VAD LEVITRA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Levitra innehåller vardenafil, som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras-typ 5-hämmare. De används för behandling av **erektil dysfunktion** hos vuxna män, ett tillstånd som innebär svårigheter med att få och behålla **enerektion**.

Åtminstone 1 av 10 män har någon gång problem med att få eller bibehålla **erektion**. Det kan finnas fysiska orsaker eller psykologiska orsaker, eller en **blandning** av båda. Vad det än beror på så gör förändringar i muskler och blodkärl att det inte stannar tillräckligt med blod kvar i penis för att göra den styv och behålla den styv.

Levitra verkar endast när du är sexuellt stimulerad. Levitra minskar effekten av de naturliga ämnen i din kropp, som gör att **erektionen** försvinner. Levitra tillåter en **erektion** att kvarstå tillräckligt länge för att du ska kunna fullfölja en sexuell aktivitet på ett tillfredsställande sätt.

## 2. INNAN DU TAR LEVITRA

### Ta inte Levitra

- Om du är allergisk (överkänslig) mot vardenafil eller något av övriga innehållsämnen i Levitra. Se innehållsämnen avsnitt 6. Tecken på en **allergisk reaktion**inbegriper hudutslag, **klåda**, svullet ansikte eller svullna läppar och andnöd.

- Om du tar mediciner innehållande nitrater, såsom **glyceryltrinitrat** mot kärlkramp eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit. Ditt **blodtryck** kan allvarligt påverkas genom att ta dessa läkemedel samtidigt med Levitra.
- Om du tar ritonavir eller indinavir, läkemedel som används för att behandla **infektioner** med humant immunbristvirus (HIV).
- Om du är över 75 år och tar **ketokonazol** eller itrakonazol, läkemedel mot svamp.
- Om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem.
- Om du får njurdialys.
- Om du nyligen har haft **stroke** eller hjärtinfarkt.
- Om du har eller har haft lågt **blodtryck**.
- Om det finns ärftliga ögonsjukdomar i din släkt (såsom näthinneinflammation).
- Om du någon gång har haft ett tillstånd som inneburit att du förlorat synen genom skada på **synnerven** vilket kan orsakas av otillräcklig blodtillförsel, så kallad icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION).

### Var särskilt försiktig med Levitra

- Om du har problem med hjärtat. Det kan vara riskfyllt för dig att ha sex.
- Om du har oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi) eller medfödd hjärtsjukdom som påverkar ditt **elektrokardiogram (EKG)**.
- Om du har något kroppsligt tillstånd som har inverkan på penisformen. Detta inkluderar tillstånd kallade vinkling, Peyronies sjukdom och bindvävssjukdom i svällkropparna.
- Om du har en sjukdom som kan ge **erektioner** som inte försvinner (priapism). Detta inbegriper sickelcellanemi, multipelt **myelom** och **leukemi**.
- Om du har **magsår** (också kallat gastriskt eller peptiskt **magsår**).
- Om du har rubbningar i blodets förmåga att koagulera (såsom **hemofili**).
- Om du använder några andra behandlingar mot erektionssvårigheter, inklusive Levitra filmdragerade tabletter. Se "Intag av andra läkemedel".
- Om du upplever plötslig synförsämring eller synförlust, sluta ta Levitra och kontakta omedelbart din läkare.

### Barn

Levitra är inte avsett för användning till barn eller ungdomar under 18 år.

### Intag av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Några läkemedel kan orsaka problem, särskilt dessa:

- Nitrater, läkemedel mot kärlkramp eller kväveoxid-donatorer, såsom amylnitrit. Ditt **blodtryck** kan allvarligt påverkas genom att ta dessa läkemedel samtidigt med Levitra. *Tala med en läkare innan du tar Levitra.*
- Läkemedel som påverkar hjärtrytmen, såsom **kinidin**, **prokainamid**, **amiodaron** eller **sotalol**.
- Ritonavir eller indinavir, läkemedel mot **HIV**. *Tala med din läkare innan du tar Levitra.*
- **Ketokonazol** eller itrakonazol, läkemedel mot svamp.
- Erytromycin eller klaritromycin, **makrolid antibiotika**.
- Alfa-receptorblockerare, en typ av läkemedel som används vid behandling mot högt **blodtryck** och godartad prostataförstoring.

Använd inte Levitra **munsönderfallande** tabletter i kombination med någon annan behandling för **erektill dysfunktion**, inklusive Levitra filmdragerade tabletter.

### **Intag av Levitra med mat och dryck:**

- Du kan ta Levitra **munsönderfallande** tabletter med eller utan mat – men ta inte denna medicin tillsammans med vätska.
- Drick inte grapefruktjuice när du använder Levitra. Det kan påverka effekten av läkemedlet.
- Intag av alkohol kan göra erektionssvårigheterna värre.

### **Graviditet och amning**

Levitra ska inte användas till kvinnor.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Levitra kan göra att en del människor känner sig yra eller påverka deras syn. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr, eller om din syn är påverkad efter att ha tagit Levitra.

### **Viktig information om några innehållsämnen i Levitra 10 mg munsönderfallande tablett**

- Aspartam är en källa till fenylalanin och kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.
- Sorbitol: Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

## **3. HUR DU TAR LEVITRA MUNSÖNDER-FALLANDE TABLETTER**

Ta alltid Levitra enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig **dos** är 10 mg.

Ta Levitra ungefär 60 minuter före sexuell aktivitet. Med sexuell stimulering kan du få en **erektion** någon gång mellan 25 minuter och upp till 4 till 5 timmar efter att ha tagit Levitra.

- Ta inte ut den **munsönderfallande** tablett från blistern förrän du ska ta den. Dra med torra händer ut änden av blistern ur blisterhållaren och tryck försiktigt på ovansidan för att få ut tablett i handen. Krossa inte tablett.
- Lägg hela den **munsönderfallande** tablett i munnen, på tungan. Tablett kommer att lösas upp på några sekunder. Svälj sedan ner den med saliven. Den **munsönderfallande** tablett måste tas utan vätska.



**Ta inte Levitra **munsönderfallande** tabletter** med någon annan form av Levitra.

**Använd inte Levitra** mer än en gång per dygn.

Tala om för din läkare om du tror att Levitra är för stark eller för svag. Han eller hon kan **ordinera** byte till en annan formulering av Levitra med en annan **dos**, beroende på hur bra det fungerar för dig.

### **Om du har tagit för stor mängd av Levitra**

Män som tar för mycket Levitra kan uppleva flerbiverkningar eller få allvarlig ryggsmärta. Om du tar mer Levitra än du borde ska du tala om det för din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR**

Liksom alla läkemedel kan Levitra orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flestabiverkningarna är av mild till måttlig svårighetsgrad.

Delvis, plötslig, tillfällig eller permanent synförsämring eller synförlust på det ena eller bägge ögonen har upplevts av patienter. Sluta ta Levitra och kontakta läkare omedelbart. Plötslig hörselnedsättning eller dövhet har rapporterats.

Tänkbara biverkningar är redovisade i följande kategorier:

### **Mycket vanliga biverkningar** (förekommer hos fler än 1 användare av 10)

- Huvudvärk

### **Vanliga biverkningar** (förekommer hos 1 till 10 användare av 100)

- Yrsel
- Blodvallning
- Nästäppa eller rinnande näsa
- Magbesvär

### **Mindre vanliga biverkningar** (förekommer hos 1 till 10 användare av 1000)

- Svullnad av hud och slemhinnor som innefattar svullnad av ansikte, läppar och svalg
- Sömnbesvär
- Domningar och minskad känslighet för beröring
- Sömnighet
- Synpåverkan såsom röda ögon, påverkan på färgseendet, ögonsmärta och -obehag, ljuskänslighet
- Ringning i öronen, svindel
- Ökad hjärtfrekvens eller hjärklappning
- Andnöd
- Nästäppa
- Sura uppstötningar, magkatarr, ont i magen, diarré, kräkning, illamående, **muntorrhet**
- Förhöjda nivåer av leverenzymmer i blodet

- Hudutslag, hudrodnad
- Rygg- eller muskelsmär, ökning av ett muskelenzym i blodet (kreatinfosfokinas), muskelstelhet
- Förlängda [erekationer](#)
- Sjukdomskänsla

**Sällsynta biverkningar** (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000)

- [Inflammation](#) i ögat (konjunktivit)
- [Allergisk reaktion](#)
- Ångest
- Svimning
- Minnesförlust
- Krampanfall
- Ökat tryck i ögat ([glaukom](#)), ökat tårflöde
- Påverkan på hjärtat (såsom hjärtattack, förändrad hjärtrytm eller kärlkramp)
- Högt eller lågt [blodtryck](#)
- Näsblod
- Påverkan på resultaten av blodprover för att undersöka leverfunktionen
- Överkänslighet hos huden för solljus
- Smärtsamma [erekationer](#)
- Bröstsmärta

Om några [biverkningar](#) blir värre eller om du märker några [biverkningar](#) som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## 5. HUR LEVITRA SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt och ljuskänsligt.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

### Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är vardenafil. Varjemunsönderfallande tablett innehåller 10 mg vardenafil (som hydroklorid).
- Övriga innehållsämnen i tablettarna är: Magnesiumstearat, aspartam (E951), pepparmintarom, mannitol (E421), sorbitol (E420), krospovidon och kolloidal kiseldioxid (hydratiserad).

## **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Levitra 10 mg **munsönderfallande** tabletter är runda och vita. De tillhandahålls i förpackning med 1, 2, 4 eller 8 tabletter (innehållande aluminium/aluminiumblister eller aluminium/aluminiumblister i blisterhållare).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

## **Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare**

Innehavare av godkännande för försäljning  
Bayer Pharma AG,  
13342 Berlin,  
Tyskland

Tillverkare  
Bayer Pharma AG,  
51368 Leverkusen,  
Tyskland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.